

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

МИКРОЛАКС® / MICROLAX®

Регистрационный номер:

П № 011146/01.

Торговое название препарата:

МИКРОЛАКС® (MICROLAX®).

Лекарственная форма:

раствор для ректального введения.

Состав 1 мл раствора:

Активные компоненты: Натрия цитрат – 90 мг, натрия лаурилсульфоацетат 70% – 12,9 мг (соответствует 9 мг натрия лаурилсульфоацетата), раствор сорбита 70% – 893 мг (соответствует 625 мг сорбита). Вспомогательные компоненты: Кислота сорбиновая, глицерин, вода.

Описание:

бесцветная, опалесцирующая вязкая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: слабительное средство.
Код АТХ: А06АG11.

Фармакологические свойства:

МИКРОЛАКС® - комбинированный препарат, оказывающий слабительное действие. Эффект наступает через 5 – 15 мин. В состав препарата входят натрия цитрат (пептизатор, который вытесняет связанную воду, содержащуюся в каловых массах), натрия лаурилсульфоацетат (разжижает содержимое кишечника) и сорбит (усиливает слабительное действие путем стимуляции поступления воды в кишечник). Увеличение количества воды за счет пептизации и разжижения способствует размягчению каловых масс и облегчает опорожнение кишечника.

Показания к применению:

Запор, в т.ч. с энкопрезом, подготовка к эндоскопическому (ректоскопия) и рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации:

Специальных мер предосторожности не требуется.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 3 лет – вводить содержимое одной микроклизмы (5 мл) ректально, вставляя наконечник на всю длину.
Новорожденные и дети до 3-х лет – вводить наконечник на половину длины (см. отметку на наконечнике).
Если жалобы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к врачу.

Указания по применению:

Отломите пломбу на наконечнике тюбика.
Слегка надавите на тюбик так, чтобы капля препарата смазала кончик клизмы – это

облегчит процесс введения.

Введите наконечник клизмы целиком (детям до 3-х лет - на половину длины) в прямую кишку.

Сдавливая тубик, выдавите полностью его содержимое.

Извлеките наконечник, по-прежнему слегка сдавливая тубик.

Побочные эффекты:

Легкое ощущение жжения в ректальной области; отдельные случаи повышенной чувствительности.

Передозировка:

Не описана.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Форма выпуска:

Раствор для ректального введения 5 мл в микроклизме для однократного применения (полиэтиленовый тубик с наконечником и отламывающейся пломбой). 4 микроклизмы вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Срок годности:

5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Примечание:

Маркировка срока годности на упаковке (период от даты производства до даты указанной в пункте «годен до») может быть меньше 5 лет на 1 месяц.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек:

без рецепта.

Производитель:

«Фамар Орлеан», Франция

5 авеню де Консир, 45071 Орлеан Седекс 2, Франция/ Famar Orleans, 5 avenue de Consur, 45071 Orleans Cedex 2, France

Представительство в России (организация, принимающая претензии): ООО "Джонсон & Джонсон", Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д.17, стр.2, тел. (495) 726-55-55